

MORDIDA ABERTA ANTERIOR PROVOCADA POR SUCÇÃO DE POLEGAR: QUANDO E COMO INTERVIR

RESUMO

Anderson Nicolly Fernandes da Costa

Lélia Maria Guedes Queiroz

Marcelo Gadelha Vasconcelos

Rodrigo Gadelha Vasconcelos

Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Centro de Ciências da Saúde

Departamento de Odontologia

RESUMO

Introdução: O mecanismo de sucção consiste na interposição do dedo na região anterior, ocasionando pressões inadequadas onde a porção digital irá atuar promovendo forças para vestibular e apical nos dentes anteriores e superiores, e o dorso do polegar irá promover forças para lingual e apical nos dentes anteriores inferiores, resultando na mordida aberta anterior. **Objetivo:** Realizar uma revisão sistemática da literatura e orientar como o odontólogo deve proceder diante de um paciente com mordida aberta anterior. **Métodos:** Selecionar artigos na literatura utilizando as bases de pesquisa MEDLINE, LILACS, Science Direct e BBO. **Resultados:** Os sinais clássicos do hábito de sucção digital são a mordida aberta anterior, vestibularização dos incisivos superiores e lingualização dos inferiores, além da atresia maxilar. No entanto considera-se tal função normal, apesar de ser considerada um hábito deletério, a qual irá suprir não só as necessidades nutricionais (sucção nutritiva) do recém nascido, bem como as necessidades emocionais (sucção não-nutritiva) e de maturação, através de estímulos nervosos tais como o contato lábio-língua-seio materno. **Conclusão:** Portanto, é de suma importância que o odontólogo conheça as necessidades destes pacientes para minimizar e prevenir futuras consequências que podem comprometer a saúde e a qualidade de vida desses.

Palavras-Chave: Mordida Aberta. Sucção de Dedo. Hábitos. Má Oclusão. Ortodontia.